

POKRET "NAUKA MLADIMA" SRH
DRUŠTVO MATEMATIČARA I FIZIČARA SRH

M A T E M A T I K A

ZADACI ZA OPĆINSKI SUSRET UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SRH 1990.

IV. RAZRED

1. Ako za kuteve α i β trokuta vrijedi

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \beta} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} \beta},$$

tada je trokut jednakokračan ili pravokutan. Dokaži!

2. Koliki je najveći mogući broj sjecišta dijagonala konveksnog 50-terokuta?

3. Nadji jednadžbu zajedničke tangente parabola $y=x^2$ i $x=y$

4. za zadani prirođan broj m , $m \geq 2$, nadji sve parove $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ takve da u nizovima

$$x_{k+1} = x_1 x_k - y_1 y_k$$

$$(k \in \mathbb{N})$$

$$y_{k+1} = x_1 y_k + y_1 x_k$$

bude $x_m=1$, $y_m=0$.

(Svaki zadatak nosi 25 bodova)

RJEŠENJA (IV RAZRED):

1. Zbog $(\tan \alpha)/(\tan \beta) > 0$ su kutevi α i β siljasti, tj.

$$(1) \quad \alpha, \beta \in (0, \pi/2)$$

... 5b

Vrijedi

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \beta} = \frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$$

tj.

(2)

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \left(\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} - \frac{\cos \alpha}{\cos \beta} \right) = 0$$

... 5b

Zbog (1) je $(\sin \alpha)/(\sin \beta) \neq 0$, pa iz (2) slijedi

$$\sin \alpha \cos \beta = \sin \beta \cos \alpha, \text{ tj. } \sin 2\alpha = \sin 2\beta.$$

... 5b

Ova jednakost je moguća ili kad je $2\alpha = 2\beta$, tj. trokut

jednakokračan, ili kad je $\pi - 2\alpha = 2\beta$


... 5b

tj. $\gamma = \pi/2$, (pravokutan trokut)

2. Broj sjecišta dijagonala konveksnog 50-trokuta bit će
najveći ako se niti koje tri dijagonale ne sijeku u istoj (unutrašnjoj) točki. Za svaki presjek dviju dijagonala trebaju četiri vrha. Dakle ukupno ima naivije

$$\binom{50}{4} = 230300 \text{ presjeka.}$$

3. Neka su $T_1(x_1, y_1), T_2(x_2, y_2)$ dirališta i $y=kx+l$
tražena tangenta (slika).



Vrijedi

$$(1) \quad k=2x_1=-1/(2/x_2) \text{ tj.}$$

$$(2) \quad 16x_1^2 = 1/x_2$$

Također je

$$k=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$$

$$\text{Zbog } y_1=x_1^2, y_2=-x_2^{1/2} \text{ je (2) je } k=4x_1(1-4x_1^3)/(1-16x_1^3)$$

$$\text{Iz } k=2x_1 \text{ dobivamo } x_1=-1/2 \text{ i dojavimo } T_1(-1/2, 1/4), T_2(1/4, -1/2).$$

Jednadžba tangente je $y=-x-1/4$.

NAPOMENA: Sa slike se zbog simetričnosti odmah vidi da je

$k=-1$. Ako učenik to primijeti, nagraditi sa 10

bodova.

$$A_{k=1} = 2 \cdot 2^2$$

4. Definiramo niz kompleksnih brojeva $z_n = x_n + iy_n, n \geq 1, z_n = z_{n-1} \cdot z_1$:

Treba naći x_1 i y_1 tako da bude $z_m = 1$, tj. $z_1^m = 1$, tj. $z_1 = \sqrt[m]{1}$.

Dakle postoji m rješenja:

$$x_1 = \cos(2k\pi/m), y_1 = \sin(2k\pi/m), k=0, 1, \dots, m-1$$