

MATEMATIKA

Zadaci za županijsko natjecanje učenika
osnovnih škola Republike Hrvatske


6. travnja 2001. godine

7. razred

1. Riješi jednadžbu

$$3.8 - (0.8 - 4.5x) = \left(1\frac{2}{5} + 3.5 : 1\frac{1}{4}\right) : 2\frac{2}{5} + 3.4 : 1\frac{8}{9} + 2.4x - 0.35 + 1.5x$$

2. Odredi najmanji cijeli broj x za kojeg vrijedi $x > y - 1$ i $2y - 1 > 0$.
3. Dućan sportske opreme prodaje romobile koje nabavlja od proizvođača. Zarada dućana po prodanom romobilu iznosi 10% njegove nabavne cijene. Kad bi dućan romobile nabavljao po 10% nižoj nabavnoj cijeni, a prodavao sa zaradom od 20% te nabavne cijene, prodajna cijena romobila bila bi 15 kn manja. Kolika je prodajna cijena romobila?
4. Nad stranicama $\overline{AC}$ i $\overline{BC}$ šiljastokutnog trokuta ABC s vanjske su strane nacrtani kvadrati $ACMN$ i $CBED$. Dokaži da je $|AD| = |BM|$ i $AD \perp BM$.
5. Dana su dva usporedna pravca p i q , te točke A i B , kao na slici. Neka je A_1 simetrična točka točki A , a B_1 simetrična točka točki B s obzirom na pravac p , te A_2 simetrična točka točki A_1 , a B_2 simetrična točka točki B_1 s obzirom na pravac q . Dokaži da dužine $\overline{AB_2}$ i $\overline{BA_2}$ raspolavljaju jedna drugu.



OVDJE JE DAN JEDAN NAČIN RJEŠAVANJA ZADATAKA. UKOLIKO UČENIK IMA DRUGAČIJI POSTUPAK RJEŠAVANJA, ČLAN POVJERENSTVA DUŽAN JE I Taj POSTUPAK BODOVATI I OCIJENITI NA ODGOVARAJUĆI NAČIN.

1. Izvršimo li naznačene operacije, imamo redom:

$$\begin{aligned} 3.8 - 0.8 + 4.5x &= (1\frac{2}{5} + 2\frac{4}{5}) : 2\frac{2}{5} + 1\frac{4}{5} + 2.4x - 0.35 + 1.5x, & 2 \text{ BODA} \\ 3 + 4.5x &= 4\frac{1}{5} : 2\frac{2}{5} + 1\frac{4}{5} + 3.9x - 0.35, & 2 \text{ BODA} \\ 3 + 4.5x &= 1\frac{1}{4} + 1\frac{4}{5} + 3.9x - 0.35, & 1 \text{ BOD} \\ 3 + 4.5x &= 3.2 + 3.9x, & 1 \text{ BOD} \\ 0.6x &= 0.2, & 2 \text{ BODA} \\ x &= \frac{1}{3}. & 2 \text{ BODA} \end{aligned}$$

..... UKUPNO 10 BODOVA

2. Iz nejednakosti $x > y - 1$ slijedi nejednakost $x + 1 > y$.

1 BOD

Iz nejednakosti $2y - 1 > 0$ dobivamo $2y > 1$, tj. $y > \frac{1}{2}$.

2 BODA

Zato je $x + 1 > y > \frac{1}{2}$,

2 BODA

pa zbog tranzitivnosti imamo da je $x + 1 > \frac{1}{2}$, odnosno $x > \frac{1}{2} - 1$ tj. $x > -\frac{1}{2}$.

3 BODA

Prema tome, najmanji traženi cijeli broj je $x = 0$.

2 BODA

..... UKUPNO 10 BODOVA

3. Neka je x nabavna cijena jednog romobila, izražena u kunama. Budući da je zarada 10%, tj. $0.1x$, slijedi da je prodajna cijena $1.1x$ kn.

1 BOD

Nabavna cijena niža 10% bila bi $0.9x$ kn.

1 BOD

Tada bi zarada od 20% na tu nabavnu cijenu bila $0.9x \cdot 0.2 = 0.18x$ kn,

1 BOD

a to znači da bi prodajna cijena uz navedene uvjete bila $0.9x + 0.18x = 1.08x$ kn.

2 BODA

Zato vrijedi jednadžba $1.08x + 15 = 1.1x$.

2 BODA

Njeno rješenje je $x = 750$.


1 BOD

Prema tome, prodajna cijena romobila je $750 + 75 = 825$ kn.

2 BODA

..... UKUPNO 10 BODOVA

4.



Skica

1 BOD

Prvo treba dokazati da je $\triangle ADC \cong \triangle MCB$. Naime, očito je $|AC| = |CM|$ i $|CD| = |BC|$. Osim toga, $\angle ACD = \angle ACB + \angle BCD$ i $\angle BCM = \angle ACB + \angle ACM$, pa zbog $\angle BCD = \angle ACM = 90^\circ$ slijedi da je $\angle ACD = \angle ACB + 90^\circ = \angle BCM$. Time je sukladnost dokazana (S-K-S).

3 BODA

Zbog toga je dalje $|AD| = |BM|$.

1 BOD

Neka je točka S presjek pravaca AD i BM , a točka R presjek pravca AD i stranice $\overline{BC}$ trokuta ABC .

Za dokaz okomitosti pravaca AD i BM dovoljno je promatrati kutove trokuta BSR i DCR .

2 BODA

Budući da je zbog dokazane sukladnosti $\angle ADC = \angle RDC = \angle MBC = \angle SBR$, tj. $\angle RDC = \angle SBR$, a vrijedi i $\angle BRS = \angle DRC$, jer su to vršni kutovi, zaključujemo da trokuti BSR i DCR imaju dva para jednakih kutova.


2 BODA

To znači da im je i treći par kutova jednak. Zato je $\angle BSR = \angle DCR = \angle DCB = 90^\circ$, iz čega slijedi da je $AD \perp BM$.

1 BOD

..... UKUPNO 10 BODOVA

5.

Slika i određivanje točaka A_2 i B_2

2 BODA

Označimo s d udaljenost usporednih pravaca p i q . Neka je a udaljenost točke A od pravca p , a b udaljenost točke A_1 od pravca q . Prema definiciji osne simetrije slijedi da je $|AA_1| = 2a$ i $|A_1A_2| = 2b$. Zato je $|AA_2| = 2a + 2b$, a zbog $a + b = d$ dalje i $|AA_2| = 2d$.

2 BODA

Neka je c udaljenost točke B od pravca q . Tada je udaljenost točke B od pravca p jednaka $c + d$, iz čega slijedi da je $|BB_1| = 2(d + c)$. To znači da je udaljenost točke B_1 od pravca q jednaka $2d + 2c - c$, tj. $2d + c$. Kako je i točka B_2 od pravca q udaljena za $2d + c$, slijedi da je $|BB_2| = 2d + c - c$, tj. $|BB_2| = 2d$.

2 BODA

Sada je očito $|AA_2| = |BB_2|$.

1 BOD

Zbog $AA_2 \perp p$ i $B_1B_2 \perp p$ slijedi da su pravci AA_2 i BB_2 usporedni, pa zaključujemo da je četverokut ABB_2A_2 paralelogram.

2 BODA

Kako su dužine $\overline{AB_2}$ i $\overline{BA_2}$ dijagonale tog paralelograma, a dijagonale paralelograma međusobno se raspolavljaju, slijedi da dužine $\overline{AB_2}$ i $\overline{BA_2}$ raspolavljaju jedna drugu.

1 BOD

..... UKUPNO 10 BODOVA