

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO  
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

## MATEMATIKA

Zadaci za Županijsko natjecanje učenika  
srednjih škola Republike Hrvatske

8. travnja 2005.

### I. razred

1. Odredite sve trojke realnih brojeva  $x, y, z$  za koje vrijedi

$$4xyz - x^4 - y^4 - z^4 = 1.$$

2. Na stranicama  $\overline{AB}$  i  $\overline{AD}$  paralelograma  $ABCD$  odabrane su redom točke  $E$  i  $F$  takve da je  $EF \parallel BD$ . Dokažite da trokuti  $BCE$  i  $CDF$  imaju jednake površine.  
3. Ako su  $a, b, c$  pozitivni realni brojevi takvi da je

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1,$$

dokažite nejednakost

$$(a-1)(b-1)(c-1) \geq 8.$$

4. Dokažite da je

$$\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2004^2} + \frac{1}{2005^2}} = 2005 - \frac{1}{2005}.$$

*Svaki zadatak vrijeđi 25 bodova.*

Rješenja zadataka za I. razred.

Svaki točno riješen zadatak vrijedi 25 bodova.

1. *Prvo rješenje.* Transformirajmo jednadžbu u pogodniji oblik:

$$4xyz = (1 + x^4) + (y^4 + z^4)$$

$$4xyz = (1 - x^2)^2 + 2x^2 + (y^2 - z^2)^2 + 2y^2z^2$$

$$0 = (1 - x^2)^2 + (y^2 - z^2)^2 + 2(x^2 - 2xyz + y^2z^2)$$

$$0 = (1 - x^2)^2 + (y^2 - z^2)^2 + 2(x - yz)^2.$$

*Napomena.* I slično svedeno na oblik "suma kvadrata = 0". 15 bodova

Odarde dobivamo:  $x^2 = 1$ ,  $y^2 = z^2$ ,  $x = yz$ , 5 bodova

odakle je  $(x, y, z) \in \{(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, -1, 1), (-1, 1, -1)\}$ . 5 bodova

*Druge rješenje.* Koristimo nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine:

$$xyz = \frac{x^4 + y^4 + z^4 + 1}{4} \stackrel{A-G}{\geq} \sqrt[4]{x^4 \cdot y^4 \cdot z^4 \cdot 1} = |xyz| \geq xyz.$$

10 bodova

Jednakost vrijedi ako i samo ako je  $x^4 = y^4 = z^4 = 1$

5 bodova

i  $xyz \geq 0$ ,

5 bodova

odakle se dobivaju rješenja:

$(x, y, z) \in \{(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, -1, 1), (-1, 1, -1)\}$ .


5 bodova

*Napomena.* Ako učenik samo pogodi rješenje  $x = y = z = 1$ ,

onda je to 0 bodova. Ako pogodi sva četiri rješenja, onda

dobiva 5 bodova.

2. *Prvo rješenje.* Primijetimo najprije da trokuti  $CDF$  i  $BDF$  imaju zajedničku osnovicu  $\overline{DF}$  i jednake duljine visina na nju (jer je  $DF \parallel BC$ ), pa je  $P(CDF) = P(BDF)$ . 8 bodova



Zatim, trokuti  $BDF$  i  $BDE$  imaju zajedničku osnovicu  $\overline{BD}$  i jednake duljine visina na nju (jer je  $BD \parallel EF$ ), pa je  $P(BDF) = P(BDE)$ .

9 bodova

Konačno, trokuti  $BDE$  i  $BCE$  imaju zajedničku osnovicu  $\overline{BE}$  i jednaku visinu na nju (jer je  $BE \parallel CD$ ), pa je


$P(BDE) = P(BCE)$ .

8 bodova

Odarde je  $P(BCE) = P(CDF)$ .

*Drugo rješenje.* Kako je  $P(ABC) = P(ACD)$ , dovoljno je pokazati da je  $P(AEC) = P(AFC)$ .

5 bodova



Neka je  $P$  sjecište pravaca  $AC$  i  $EF$ . Točka  $P$  je polovište dužine  $\overline{EF}$ ,

5 bodova

pa su trokuti  $EMP$  i  $FNP$  sukladni (jednaki kutovi i jedna stranica). Dakle,  $|EM| = |FN|$ .

10 bodova

No, trokuti  $AEC$  i  $ACF$  imaju zajedničku osnovicu  $\overline{AC}$  i duljine visina  $\overline{EM}$  i  $\overline{FN}$ , pa su im površine jednake.

5 bodova

3. *Prvo rješenje.* Množenjem dane jednakosti s  $abc$  dobivamo

$$ab + bc + ca = abc. \quad (*) \quad 3 \text{ boda}$$

Sada imamo

$$\begin{aligned} (a-1)(b-1)(c-1) &= abc - (ab + bc + ca) + a + b + c - 1 \\ &= a + b + c - 1 \quad (\text{zbog } (*)). \end{aligned}$$

7 bodova

Nadalje,

$$\begin{aligned} (a+b+c+) \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) &= 3 + \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + \left( \frac{b}{c} + \frac{c}{b} \right) + \left( \frac{c}{a} + \frac{a}{c} \right) \\ &\geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9, \quad 10 \text{ bodova} \\ \implies a+b+c &\geq 9, \quad \text{tj.} \end{aligned}$$

$$(a-1)(b-1)(c-1) = a+b+c-1 \geq 8. \quad 5 \text{ bodova}$$

*Druga ideja.* Alternativno rješenje pomoću nejednakosti između harmonijske i aritmetičke sredine:

$$\frac{\frac{3}{1/a + 1/b + 1/c}}{3} \leq \frac{a+b+c}{3} \Rightarrow a+b+c \geq 9,$$

i nadalje prema prvom rješenju.

4. Uočimo da je

$$1 + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{k^4 + 2k^3 + 3k^2 + 2k + 1}{k^2(k+1)^2} = \left( \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)} \right)^2.$$

10 bodova

Zato je

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}} &= \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)} \\ &= 1 + \frac{1}{k(k+1)} = 1 + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}. \end{aligned}$$

5 bodova

Konačno imamo

$$\begin{aligned} &\sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2004^2} + \frac{1}{2005^2}} \\ &= \left( 1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left( 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left( 1 + \frac{1}{2004} - \frac{1}{2005} \right) \\ &= 2004 \cdot 1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2004} - \frac{1}{2005} \\ &= 2004 + 1 - \frac{1}{2005} = 2005 - \frac{1}{2005}. \end{aligned}$$

10 bodova

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO  
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

## MATEMATIKA

Zadaci za Županijsko natjecanje učenika  
srednjih škola Republike Hrvatske

8. travnja 2005.

II. razred

1. Trokutu  $ABC$  upisana je kružnica polujmjera  $r$  sa središtem u točki  $S$ . Pravac kroz točku  $S$  sijeće stranice  $\overline{BC}$  i  $\overline{CA}$  redom u točkama  $D$  i  $E$ . Dokažite da za površinu  $P$  trokuta  $CED$  vrijedi  $P \geq 2r^2$ . Kada vrijedi jednakost?
2. Nađite sve parove cijelih brojeva  $a$  i  $b$  za koje vrijedi

$$7a + 14b = 5a^2 + 5ab + 5b^2.$$


3. Neka je  $P$  polinom s cijelobrojnim koeficijentima takav da je  $P(5) = 2005$ . Može li broj  $P(2005)$  biti potpun kvadrat (kvadrat prirodnog broja)?
4. Dano je 99 (ne nužno različitih) prirodnih brojeva manjih od 100. Ako zbroj nikoja dva, tri ili više od tih brojeva nije djeljiv sa 100, dokažite da su svi oni međusobno jednaki.

*Svaki zadatak vrijedi 25 bodova.*

- <sup>2</sup> Rješenja zadatka za II. razred.  
Svaki točno riješen zadatak vrijedi 25 bodova.

1. Za površinu  $P$  trokuta  $CED$  vrijedi:

$$P = P(CES) + P(CSD) = \frac{1}{2}|CE| \cdot r + \frac{1}{2}|CD| \cdot r = \frac{|CE| + |CD|}{2} \cdot r. \quad 5 \text{ bodova}$$



Zbog A-G nejednakosti imamo

$$\frac{|CE| + |CD|}{2} \geq \sqrt{|CE| \cdot |CD|},$$

pa je  $P \geq \sqrt{|CE| \cdot |CD|} \cdot r$ .

Umnožak duljina dviju stranica trokuta nije manji od dvostrukе površine trokuta. U našem slučaju je  $|CE| \cdot |CD| \geq 2P$ , pri čemu vrijedi jednakost ako i samo ako je kut  $\gamma$  u vrhu  $C$  pravi. 10 bodova

Zato je  $P \geq \sqrt{|CE| \cdot |CD|} \cdot r \geq \sqrt{2P} \cdot r$ , pa slijedi  $P^2 \geq 2Pr^2$  odnosno  $P > 2r^2$ , što je i trebalo dokazati. 5 bodova

Jednakost u dokazanoj nejednakosti vrijedi ako je  $|CE| = |CD|$  i  $\gamma = 90^\circ$ . 5 bodova

2. Jednadžbu napišimo kao kvadratnu jednadžbu po  $b$ :

$$5b^2 + (5a - 14)b + 5a^2 - 7a = 0,$$

čija su rješenja

$$b_{1,2} = \frac{14 - 5a \pm \sqrt{(5a - 14)^2 - 20(5a^2 - 7a)}}{10} = \frac{14 - 5a \pm \sqrt{196 - 75a^2}}{10}. \quad 5 \text{ bodova}$$

Da bi rješenja bila realna, mora biti  $196 - 75a^2 \geq 0$  tj.

$$a^2 \leq \frac{196}{75}. \text{ Dakle, } -\frac{14}{5\sqrt{3}} \leq a \leq \frac{14}{5\sqrt{3}}. \quad 5 \text{ bodova}$$

Budući da  $a$  mora biti cijeli broj, može biti samo  $a \in \{-1, 0, 1\}$ . 5 bodova

Uvrštavanjem tih vrijednosti u izraz za  $b_{1,2}$  dobivamo:

$$1^\circ \quad a = -1 \Rightarrow b_1 = 3, b_2 \notin \mathbb{Z};$$

$$2^\circ \quad a = 0 \Rightarrow b_1 \notin \mathbb{Z}, b_2 = 0;$$

$$3^\circ \quad a = 1 \Rightarrow b_1 = 2, b_2 \notin \mathbb{Z}.$$

Rješenja dane jednadžbe su  $(a, b) \in \{(-1, 3), (0, 0), (1, 2)\}$ . 10 bodova

*Napomena.* Danu jednadžbu možemo promatrati i kao kvadratnu jednadžbu po  $a$ :

$$5a^2 + (5b - 7)a + 5b^2 - 14b = 0.$$

U ovom slučaju rješenja su

$$a_{1,2} = \frac{7 - 5b \pm \sqrt{49 + 210b - 75b^2}}{10}.$$

Iz uvjeta  $49 + 210b - 75b^2 \geq 0$  slijedi  $b \in \{0, 1, 2, 3\}$ . Uvrštavajem se vidi da su rješenja  $(a, b) \in \{(-1, 3), (0, 0), (1, 2)\}$ .

3. Neka je  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  promatrani polinom s cjelobrojnim koeficijentima  $n$ -tog stupnja. Tada imamo:

$$P(5) = a_n \cdot 5^n + a_{n-1} \cdot 5^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 5 + a_0,$$

$$P(2005) = a_n \cdot 2005^n + a_{n-1} \cdot 2005^{n-1} + \dots + a_1 \cdot 2005 + a_0.$$

Oduzimanjem dobivamo

$$P(2005) - P(5)$$

$$= a_n(2005^n - 5^n) + a_{n-1}(2005^{n-1} - 5^{n-1}) + \dots + a_1(2005 - 5) + a_0, \quad (*)$$

5 bodova

$$2005^k - 5^k = 2000(2005^{k-1} + 2005^{k-2} \cdot 5 + \dots + 2005 \cdot 5^{k-2} + 5^{k-1})$$

Izrazi u zagradama u (\*) djeljivi su s 2000, 5 bodova

pa je  $P(2005) - P(5) = 2000A$ , za neki cijeli broj  $A$ .

Dakle,  $P(2005) = 2000A + 2005$ . 5 bodova

Broj  $P(2005)$  završava znamenkama 05, pa ne može biti kvadrat prirodnog broja. 10 bodova

4. Neka su  $n_1, n_2, \dots, n_{99}$  dani brojevi s navedenim svojstvom. Pretpostavimo suprotno, tj. da među njima postoji dva različita broja, npr.  $n_1 \neq n_2$ .

Promatrajmo sljedećih 100 brojeva:

$$s_1 = n_1, s_2 = n_2, s_3 = n_1 + n_2, \dots, s_{100} = n_1 + n_2 + \dots + n_{99}. \quad 5 \text{ bodova}$$

Po pretpostavci niti jedan od brojeva  $s_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 100$  nije djeljiv sa 100. Po Dirichletovom principu, zaljučujemo da bar dva od tih brojeva imaju isti ostatak pri dijeljenju sa 100.

Neka su to brojevi  $s_k$  i  $s_l$ ,  $k > l$ . Očito to nisu  $s_1$  i  $s_2$ . 10 bodova

Kako  $s_k$  i  $s_l$  daju isti ostatak pri dijeljenju sa 100, njihova razlika  $s_k - s_l$  djeljiva je sa 100, tj.

$$100 \mid (n_1 + n_2 + \dots + n_k) - (n_1 + n_2 + \dots + n_l), \quad \text{tj.}$$

$$100 \mid (n_{l+1} + \dots + n_k),$$

što je u suprotnosti s pretpostavkom da zbroj bilo kojih od danih brojeva nije djeljiv sa 100. Zato su svi oni međusobno jednaki. 10 bodova

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO  
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

## MATEMATIKA

Zadaci za Županijsko natjecanje učenika  
srednjih škola Republike Hrvatske

8. travnja 2005.

III. razred

1. Odredite sve prirodne brojeve  $n$  za koje je broj

$$2^4 + 2^7 + 2^n$$

potpun kvadrat.

2. U trokutu s kutovima  $\alpha$ ,  $\beta$  i  $\gamma$  vrijedi jednakost

$$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \sin \gamma.$$

Ako je poznato da su kutovi  $\alpha$  i  $\beta$  šiljasti, dokažite da je kut  $\gamma$  pravi.

3. Neka je  $T$  točka unutar trostrane piramide  $ABCD$  i neka su točke  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  presjecišta pravaca  $AT$ ,  $BT$ ,  $CT$ ,  $DT$  s nasuprotnim stranama piramide, redom. Ako je

$$\frac{|AT|}{|TA_1|} = \frac{|BT|}{|TB_1|} = \frac{|CT|}{|TC_1|} = \frac{|DT|}{|TD_1|} = \lambda,$$

koje sve vrijednosti može  $\lambda$  poprimiti? Obrazložite odgovor!

4. Trokut  $ABC$  je šiljastokutan. Za bilo koju točku  $T$  iz unutrašnjosti ili s ruba trokuta  $ABC$ , točke  $T_a$ ,  $T_b$ ,  $T_c$  su redom nožista okomica iz  $T$  na stranice  $\overline{BC}$ ,  $\overline{CA}$ ,  $\overline{AB}$ . Ako je

$$f(T) = \frac{|AT_c| + |BT_a| + |CT_b|}{|TT_a| + |TT_b| + |TT_c|},$$

dokažite da  $f(T)$  ne ovisi o izboru točke  $T$  ako i samo ako je trokut  $ABC$  jednakostraničan.

*Svaki zadatak vrijedi 25 bodova.*

Rješenja zadataka za III. razred.

Svaki točno riješen zadatak vrijedi 25 bodova.

1. Budući da je  $2^4 + 2^7 = 144 = 12^2$ , ako stavimo

$$144 + 2^n = m^2,$$

za prirodni broj  $m$ , onda je

$$2^n = m^2 - 144 = (m - 12)(m + 12). \quad . . . . . 3 \text{ boda}$$

Svaki od faktora na desnoj strani mora biti potencija broja 2.

Neka je

$$\begin{aligned} m + 12 &= 2^p, \\ m - 12 &= 2^q, \end{aligned}$$

pri čemu je  $p, q \in \mathbb{N}_0$ ,  $p + q = n$  i  $p > q$ .

7 bodova

Oduzimanjem gornjih jednadžbi dobiva se

$$2^q(2^{p-q} - 1) = 2^3 \cdot 3. \quad . . . . . 5 \text{ boda}$$

Budući da je faktor  $2^{p-q} - 1$  neparan, a  $2^q$  potencija od 2, ova jednadžba ima samo jedno rješenje i to  $q = 3$  i  $p - q = 2$ . Dakle,  $p = 5$  i  $q = 3$ , odnosno

$$n = p + q = 8$$

je jedini prirodni broj za koji je zadani izraz potpuni kvadrat: . . . . . 10 bodova

*Napomena.* Zadatak je moguće riješiti i izlučivanjem  $2^4$  uz pretpostavku da je  $n > 3$ . Tada će zbog

$$2^4 + 2^7 + 2^n = 2^4(1 + 8 + 2^{n-4}).$$

polazni izraz biti potpuni kvadrat ako i samo ako je  $9 + 2^{n-4}$  potpuni kvadrat. Od ovog mjeseta zadatak se rješava kao u gornjem rješenju i u skladu s time boduje.

Međutim, u ovom načinu rješavanja mora se provjeriti da promatrani izraz nije potpuni kvadrat za  $n = 1, 2, 3$ . Izravnom provjerom se dobije  $2^4 + 2^7 + 2^n = 146, 148, 152$ , a to nisu potpuni kvadrati. Učenik koji zaboravi to provjeriti, a riješi zadatak na ovaj način gubi 3 boda.

2. Budući da je zbroj kutova u trokutu jednak  $\pi$ , koristeći adicijski teorem, zadana jednakost se može zapisati u obliku

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta &= \sin(\pi - (\alpha + \beta)) \\ &= \sin(\alpha + \beta) \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta. \end{aligned}$$

3 boda

Prebacivanjem članova sa  $\sin \alpha$  na lijevu, a onih sa  $\sin \beta$  na desnu stranu jednakosti dobiva se

$$\sin \alpha(\sin \alpha - \cos \beta) = \sin \beta(\cos \alpha - \sin \beta). \quad (1)$$

Koristeći formulu  $\cos \phi = \sin \left( \frac{\pi}{2} - \phi \right)$  i formulu za razliku sinusa, izrazi u zagradi se zapišu kao umnošci:

$$\begin{aligned}\sin \alpha - \cos \beta &= \sin \alpha - \sin \left( \frac{\pi}{2} - \beta \right) \\&= 2 \sin \frac{\alpha - \frac{\pi}{2} + \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \frac{\pi}{2} - \beta}{2} \\&= 2 \sin \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} \cos \frac{2\alpha - 2\beta + \pi}{4}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos \alpha - \sin \beta &= \sin \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) - \sin \beta \\&= 2 \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \alpha + \beta}{2} \\&= -2 \sin \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} \cos \frac{2\beta - 2\alpha + \pi}{4}\end{aligned}$$

Na taj način jednakost (1) postaje

$$\begin{aligned}2 \sin \alpha \sin \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} \cos \frac{2\alpha - 2\beta + \pi}{4} \\= -2 \sin \beta \sin \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} \cos \frac{2\beta - 2\alpha + \pi}{4}. \quad (2)\end{aligned}$$

7 bodova

Ideja dokaza da je kut  $\gamma$  pravi jest usporedba predznaka lijeve i desne strane jednakosti (2).

3 boda

*Napomena:* Učeniku koji koristi ovu ideju, čak iako ne riješi zadatak dati ~~3 boda~~ 3 boda.

Najprije, očito je da su  $\sin \alpha$  i  $\sin \beta$  pozitivni (jer su  $\alpha$  i  $\beta$  kutovi trokuta). Nadalje, budući da su  $\alpha$  i  $\beta$  šiljasti vrijede (stroge) nejednakosti

$$\begin{aligned}-\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}, \\-\frac{\pi}{2} < \beta - \alpha < \frac{\pi}{2},\end{aligned}$$

pa je

$$\begin{aligned}0 < \frac{2\alpha - 2\beta + \pi}{4} < \frac{\pi}{2}, \\0 < \frac{2\beta - 2\alpha + \pi}{4} < \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Stoga su i faktori s kosinusom na obje strane jednakosti (2) pozitivni. Na kraju, budući da je preostali faktor  $\sin \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4}$  zajednički na obje strane u (2) zaključujemo da će strane te jednakosti imati jednake predznake jedino ako vrijedi

$$\sin \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} = 0.$$

7 bodova

Kutovi  $\alpha$  i  $\beta$  su šiljasti pa je  $0 < \alpha + \beta < \pi$  odnosno

$$-\frac{\pi}{4} < \frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} < \frac{\pi}{4}.$$


Stoga je gornji sinus jednak nuli jedino ako vrijedi

$$\frac{2\alpha + 2\beta - \pi}{4} = 0$$

odakle slijedi  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ , odnosno  $\gamma = \frac{\pi}{2}$ . 5 bodova

3. Prvi korak u rješenju ovog zadatka je zapisati zadani omjer koristeći volumene određenih piramida. Točnije dokazimo da vrijedi

$$\frac{|AA_1|}{|TA_1|} = \frac{V(ABCD)}{V(TBCD)}. \quad (3) \quad \text{3 boda}$$



Neka je točka  $A_2$  nožište visine iz vrha  $A$  piramide  $ABCD$ , a točka  $A_3$  nožište visine iz vrha  $T$  piramide  $TBCD$  kao na slici. Te dvije visine su paralelne, a točke  $A_1$ ,  $A_2$  i  $A_3$  leže na istom pravcu (ortogonalnoj projekciji pravca  $AA_1$  na ravninu baze  $BCD$ ), pa su trokuti  $AA_1A_2$  i  $TA_1A_3$  slični.

Stoga vrijedi

$$\frac{|AA_1|}{|TA_1|} = \frac{|AA_2|}{|TA_3|} = \frac{\frac{1}{3}|AA_2|P(BCD)}{\frac{1}{3}|TA_3|P(BCD)} = \frac{V(ABCD)}{V(TBCD)},$$

i time smo dokazali (3). 7 bodova

Budući da je  $|AA_1| = |AT| + |TA_1|$  i  $\lambda = \frac{|AT|}{|TA_1|}$ , iz (3) slijedi

$$\lambda + 1 = \frac{V(ABCD)}{V(TBCD)},$$

odnosno,

$$\frac{V(TBCD)}{V(ABCD)} = \frac{1}{\lambda + 1}. \quad (4) \quad \text{5 bodova}$$

Na isti način se dokažu jednakosti analogne (4) za preostala tri vrha piramide:

$$\frac{V(TACD)}{V(ABCD)} = \frac{V(TABD)}{V(ABCD)} = \frac{V(TABC)}{V(ABCD)} = \frac{1}{\lambda + 1}.$$

Zbrajanjem tih četiriju jednadžbi i koristeći činjenicu

$$V(ABCD) = V(TBCD) + V(TACD) + V(TABD) + V(TABC), \quad \text{5 bodova}$$


dobiva se

$$1 = \frac{4}{\lambda + 1}. \quad 3 \text{ boda}$$

Ova jednadžba ima jedinstveno rješenje  $\lambda = 3$ , pa je to jedina vrijednost koju  $\lambda$  može poprimiti. 2 boda

4. Neka je trokut jednakostraničan. Dokažimo da tada  $f(T)$  ne ovisi o odabiru točke  $T$ , tj. da je  $f$  konstanta.

Za proizvoljnu točku  $T$  jednakostraničnog trokuta stranice  $a$  neka su  $A_1$  i  $A_2$  točke na  $\overline{BC}$ ,  $B_1$  i  $B_2$  točke na  $\overline{CA}$  i  $C_1$  i  $C_2$  točke na  $\overline{AB}$  takve da su  $A_1B_2$ ,  $B_1C_2$  i  $C_1A_2$  pravci kroz točku  $T$ , paralelni sa stranicama  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$  redom.



Trokuti  $TA_1A_2$ ,  $TB_1B_2$  i  $TC_1C_2$  su jednakostranični, i njihove visine su  $TT_a$ ,  $TT_b$  i  $TT_c$  redom. Zato vrijedi

$$\begin{aligned} |TT_a| + |TT_b| + |TT_c| &= |AA_1| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + |TB_1| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + |C_2T| \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= (|AA_1| + |TB_1| + |C_2T|) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \quad 3 \text{ boda}$$

i

$$\begin{aligned} |AT_c| + |BT_a| + |CT_b| &= (|AC_1| + |C_1T_c|) + (|BA_1| + |A_1T_a|) \\ &\quad + (|CB_1| + |B_1T_b|) \\ &= \left( |TB_1| + \frac{1}{2}|C_2T| \right) + \left( |BA_1| + \frac{1}{2}|A_1A_2| \right) \\ &\quad + \left( |A_2T| + \frac{1}{2}|TB_1| \right) \\ &= \frac{3}{2}(|BA_1| + |A_1A_2| + |A_2C|) = \frac{3}{2}a. \end{aligned}$$

3 boda

Dakle, za proizvoljnu točku  $T$  jednakostraničnog trokuta  $ABC$  vrijedi

$$f(T) = \frac{3a}{2} : \frac{a\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3},$$


pa  $f(T)$  ne ovisi o odabiru točke  $T$ . Time je dokazan jedan smjer. 1 bod

Dokažimo drugi smjer. Pretpostavimo da  $f(T)$  ne ovisi o odabiru točke  $T$  i dokažimo da tada trokut mora biti jednakostraničan.

Izračunajmo vrijednost  $f(T)$  za vrhove trokuta  $A, B$  i  $C$ . Zbog pretpostavke da  $f(T)$  ne ovisi o  $T$  mora biti

$$f(A) = f(B) = f(C). \quad 3 \text{ boda}$$

*Napomena.* Ako učenik umjesto vrhova odabere neke druge tri točke, zadatak se bodoj analogno.



Za  $T = A$ , točke  $T_b$  i  $T_c$  se podudaraju s točkom  $A$ , a  $T_a$  je nožiste visine iz vrha  $A$ . Ako označimo stranice nasuprot vrhova  $A, B$  i  $C$  s  $a, b$  i  $c$ , te kutove trokuta uz vrhove  $A, B$  i  $C$  s  $\alpha, \beta$  i  $\gamma$ , imamo:

$$|TT_b| = |TT_c| = 0, \quad |TT_a| = c \sin \beta,$$

$$|AT_c| = 0, \quad |BT_a| = c \cos \beta, \quad |CT_b| = b.$$

Sada lako dobivamo  $f(A) = \frac{c \cos \beta + b}{c \sin \beta}. \quad 3 \text{ boda}$

Odavde možemo nastaviti na više načina.

*Prvi način:*

Koristeći kosinusov poučak (ako s  $P$  označimo površinu trokuta  $ABC$ ) dobivamo

$$f(A) = \frac{2ac \cos \beta + 2ab}{2ac \sin \beta} = \frac{2ab + a^2 + c^2 - b^2}{4P} = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2b(a - b)}{4P}.$$

3 boda

Na isti način za preostala dva vrha vrijedi:

$$f(B) = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2c(b - c)}{4P},$$

$$f(C) = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2a(c - a)}{4P}. \quad 2 \text{ boda}$$

Po pretpostavci  $f(T)$  ne ovisi o odabiru točke  $T$  pa gornja tri izraza za  $f(A), f(B)$  i  $f(C)$  moraju biti jednaka. Stoga,

$$b(a - b) = c(b - c) = a(c - a) = x. \quad (5) \quad 2 \text{ boda}$$

Budući da su stranice trokuta  $a, b, c \neq 0$ , zbrajanjem jednakosti

$$a - b = \frac{x}{b}, \quad b - c = \frac{x}{c}, \quad c - a = \frac{x}{a},$$

dobivamo

$$0 = x \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right).$$

Izraz u zagradi je različit od nule pa je  $x = 0$ . Sada iz (5), slijedi

$$a = b = c,$$

što smo i trebali dokazati.

5 bodova

*Drugi način:* Imamo  $f(A) = \frac{c \cos \beta + b}{c \sin \beta}$ , i analogno:

$$f(B) = \frac{a \cos \gamma + c}{a \sin \gamma}, \quad f(C) = \frac{b \cos \alpha + a}{b \sin \alpha}. \quad 2 \text{ boda}$$

Po pretpostavci  $f(T)$  ne ovisi o odabiru točke  $T$  pa gornja tri izraza za  $f(A)$ ,  $f(B)$  i  $f(C)$  moraju biti jednaka. Stoga,

$$\frac{c \cos \beta + b}{c \sin \beta} = \frac{a \cos \gamma + c}{a \sin \gamma} = \frac{b \cos \alpha + a}{b \sin \alpha}. \quad 2 \text{ boda}$$

Iz jednakosti  $\frac{c \cos \beta + b}{c \sin \beta} = \frac{b \cos \alpha + a}{b \sin \alpha}$  slijedi redom

$$\begin{aligned} b c \cos \beta \sin \alpha + b^2 \sin \alpha &= b c \cos \alpha \sin \beta + a c \sin \beta \\ b c \sin(\alpha - \beta) + b^2 \sin \alpha &= a c \sin \beta = 2P \\ b c \sin(\alpha - \beta) &= b c \sin \alpha - b^2 \sin \alpha \\ c \sin(\alpha - \beta) &= (c - b) \sin \alpha \end{aligned}$$

odnosno, zbog poučka o sinusima

$$\sin \gamma \sin(\alpha - \beta) = (\sin \gamma - \sin \beta) \sin \alpha. \quad 3 \text{ boda}$$

Analogno je

$$\begin{aligned} \sin \alpha \sin(\beta - \gamma) &= (\sin \alpha - \sin \gamma) \sin \beta \\ \sin \beta \sin(\gamma - \alpha) &= (\sin \beta - \sin \alpha) \sin \gamma \end{aligned} \quad (6)$$

Množenjem ove tri jednakosti, nakon skraćivanja sa  $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \neq 0$  dobiva se:

$$\sin(\alpha - \beta) \sin(\beta - \gamma) \sin(\gamma - \alpha) = (\sin \gamma - \sin \beta)(\sin \alpha - \sin \gamma)(\sin \beta - \sin \alpha).$$

Dalje zbog  $\sin(x - y) = 2 \sin \frac{x - y}{2} \cos \frac{x - y}{2}$  i

$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x - y}{2} \cos \frac{x + y}{2}$  imamo:

$$\begin{aligned} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot \sin \frac{\beta - \gamma}{2} \cos \frac{\beta - \gamma}{2} \cdot \sin \frac{\gamma - \alpha}{2} \cos \frac{\gamma - \alpha}{2} &= \\ = \sin \frac{\gamma - \beta}{2} \cos \frac{\gamma + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \gamma}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2} \cdot \sin \frac{\beta - \alpha}{2} \cos \frac{\beta + \alpha}{2}, & \end{aligned}$$

odnosno

$$\sin \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\beta - \gamma}{2} \sin \frac{\gamma - \alpha}{2}.$$

$$\cdot \left( \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\beta - \gamma}{2} \cos \frac{\gamma - \alpha}{2} + \cos \frac{\gamma + \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2} \cos \frac{\beta + \alpha}{2} \right) = 0.$$

Kako su  $\alpha, \beta, \gamma$  šiljasti kutovi u trokutu, izraz u zagradi je pozitivan, pa mora biti

$$\sin \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\beta - \gamma}{2} \sin \frac{\gamma - \alpha}{2} = 0.$$

Neka je  $\sin \frac{\alpha - \beta}{2} = 0$ . Tada mora biti  $\alpha = \beta$  pa iz (6) slijedi  $\gamma = \alpha$ , tj. trokut je jednakostraničan, što smo i trebali dokazati. 5 bodova

*Napomena.* Slično se dobiva i ako zapišemo  $f(A) = \frac{1}{\operatorname{tg}\beta} + \frac{1}{\sin\gamma}$ .

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO  
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

**MATEMATIKA**

Zadaci za Županijsko natjecanje učenika  
srednjih škola Republike Hrvatske

8. travnja 2005.

IV. razred

1. Pokažite da za sve  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$  vrijedi

$$\sum_{k=2}^n \left( \log_{\frac{3}{2}}(k^3 + 1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3 - 1) \right) < 1 .$$

2. Neka je  $S$  točka na stranici  $\overline{AB}$  danog šiljastokutnog trokuta  $ABC$  i neka su  $P$  i  $Q$  središta kružnica opisanih trokutima  $ASC$  i  $BSC$ . Odredite položaj točke  $S$  (na stranici  $\overline{AB}$ ) tako da trokut  $PQS$  ima najmanju moguću površinu.

3. Niz  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zadan je rekurzivno:

$$a_1 = 1,$$

$$a_n = \frac{4n-2}{n} a_{n-1}, \quad n \geq 2 .$$

Dokažite da su svi članovi tog niza prirodni brojevi.

4. Prirodni brojevi  $a$ ,  $b$  i  $c$  zadovoljavaju jednakost

$$c(ac+1)^2 = (5c+2b)(2c+b).$$

- a) Ako je  $c$  neparan, dokažite da je on potpun kvadrat.  
b) Može li  $c$  biti paran?

*Svaki zadatak vrijeđi 25 bodova.*

Rješenja zadataka za IV. razred.  
Svaki točno riješen zadatak vrijedi 25 bodova.

1.

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=2}^n \left( \log_{\frac{3}{2}}(k^3 + 1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3 - 1) \right) \\
 &= \sum_{k=2}^n \log_{\frac{3}{2}} \frac{k^3 + 1}{k^3 - 1} \\
 &= \log_{\frac{3}{2}} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 + 1}{k^3 - 1} && 5 \text{ bodova} \\
 &= \log_{\frac{3}{2}} \prod_{k=2}^n \frac{(k+1)(k^2 - k + 1)}{(k-1)(k^2 + k + 1)} \\
 &= \log_{\frac{3}{2}} \left( \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^2 + k + 1} \right) && 2 \text{ boda}
 \end{aligned}$$

Uočimo da je

$$\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} = \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{5}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n-3} \cdot \frac{n}{n-2} \cdot \frac{n+1}{n-1} = \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2}.$$

i

5 bodova

$$\begin{aligned}
 & \prod_{k=2}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^2 + k + 1} \\
 &= \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{13}{21} \cdot \dots \cdot \frac{(n-1)^2 - (n-1) + 1}{(n-1)^2 + (n-1) + 1} \cdot \frac{n^2 - n + 1}{n^2 + n + 1} \\
 &= \frac{3}{n^2 + n + 1}, && (*) 
 \end{aligned}$$

jer je  $(k-1)^2 + (k-1) + 1 = k^2 - k + 1$ .

8 bodova


*Napomena:* Ukoliko učenik dobije rezultat (\*) ali ne obrazloži (\*\*), dobiva samo 5 bodova.

Konačno imamo

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=2}^n \left( \log_{\frac{3}{2}}(k^3 + 1) - \log_{\frac{3}{2}}(k^3 - 1) \right) \\
&= \log_{\frac{3}{2}} \left( \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^2 + k + 1} \right) \\
&= \log_{\frac{3}{2}} \left( \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3}{n^2 + n + 1} \right) \\
&= \log_{\frac{3}{2}} \left( \frac{3}{2} \cdot \frac{n^2 + n}{n^2 + n + 1} \right) < \log_{\frac{3}{2}} \frac{3}{2} = 1.
\end{aligned}$$

5 bodova

2. Prvo rješenje.



Neka je  $\omega = \angle ASC$ . Kako su  $|SP|$  i  $|SQ|$  polumjeri kružnica opisanih trokutima  $SAC$  i  $SBC$ , vrijedi

$$|SP| = \frac{|AC|}{2 \sin \omega} \quad \text{i} \quad |SQ| = \frac{|BC|}{2 \sin \omega}.$$

5 bodova

Također, zbog poučka o obodnom i središnjem kutu imamo

$$\begin{aligned}
\angle PSQ &= \angle PSC + \angle QSC \\
&= (90^\circ - \frac{1}{2} \angle SPC) + (90^\circ - \frac{1}{2} \angle SQC) \\
&= (90^\circ - \alpha) + (90^\circ - \beta) = 180^\circ - \alpha - \beta = \gamma.
\end{aligned}$$

5 bodova

Površina trokuta  $SPQ$  iznosi

$$\begin{aligned}
P &= \frac{1}{2} |SP| \cdot |SQ| \cdot \sin \angle PSQ = \frac{|AC| \cdot |BC| \cdot \sin \gamma}{8 \sin^2 \omega} \\
&= \frac{P(ABC)}{4 \sin^2 \omega}.
\end{aligned}$$

10 bodova

Minimum se očito postiže kad je  $\sin^2 \omega = 1$ , tj. za  $\omega = 90^\circ$ .


Tada je točka  $S$  nožište visine iz vrha  $C$ .

5 bodova

*Drugo rješenje.* Spojnica središta  $P$  i  $Q$  siječe zajedničku tetivu dviju kružnica  $\overline{CS}$  u polovištu, nazovimo ga  $S_0$ , i to pod pravim kutem. Zato je površina trokuta  $PQS$  jednaka  $\frac{1}{2} |PQ| \cdot |SS_0|$ .

5 bodova

Neka su  $P_0$  i  $Q_0$  nožišta okomica iz  $P$ ,  $Q$  na  $\overline{AB}$ . Točka  $P_0$  je polovište dužine  $\overline{AS}$  (jer je  $\overline{AS}$  tetiva kružnice sa središtem  $P$ ), a točka  $Q_0$  je polovište od  $\overline{BS}$ .



Zato je

$$\begin{aligned} P(PQS) &= \frac{1}{2} |PQ| \cdot |SS_0| \geq \frac{1}{2} |P_0Q_0| \cdot |SS_0| \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} |AB| \cdot \frac{1}{2} |CS| \geq \frac{1}{8} \cdot |AB| \cdot |CC_0| \\ &= \frac{1}{4} \cdot P(ABC), \end{aligned}$$

gdje je s  $C_0$  označeno nožište visine iz  $C$ .

10 bodova

U prvoj nejednakosti jednakost je ispunjena samo ako je  $PQ \parallel AB$ , a u drugoj samo ako je  $CS \perp AB$ . No, to je zapravo isti uvjet pa zaključujemo da točka  $S$  mora biti nožište visine iz vrha  $C$ .

10 bodova

*Treće rješenje.* Zbog poučka o obodnom i središnjem kutu vrijedi

$$\measuredangle SPQ = \frac{1}{2} \measuredangle SPC = \measuredangle SAC = \measuredangle BAC,$$

a analogno je i  $\measuredangle SQP = \measuredangle ABC$ .

Zato su trokuti  $PQS$  i  $ABC$  slični.

10 bodova

Ako je  $k = |PS|/|AC|$  koeficijent sličnosti, onda vrijedi  $P(PQS) = k^2 P(ABC)$ . Kako je  $\overline{AC}$  tetiva kružnice polumjera  $|PS|$ , vrijedi  $|AC| \leq 2|PS|$ , odnosno  $k \geq \frac{1}{2}$ .

10 bodova

Jednakost se postiže ako i samo ako je  $\overline{AC}$  promjer te kružnice, a tada je po Talesovom poučku  $\measuredangle ASC = 90^\circ$ , tj.  $CS \perp AB$ . Time je dokazano da je površina trokuta  $PQS$  minimalna kad je  $S$  nožište visine iz  $C$ .

5 bodova

3. Za svaki  $n \geq 2$  vrijedi

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2(2n-1)}{n} a_{n-1} = \frac{2^2(2n-1)(2n-3)}{n(n-1)} a_{n-2} \\ &= \dots = \frac{2^{n-1}(2n-1)(2n-3) \cdots 5 \cdot 3}{n(n-1) \cdots 3 \cdot 2} a_1. \end{aligned}$$

10 bodova

Pomnožimo brojnik i nazivnik s  $(n-1)!$   
te iskoristimo

5 bodova

$$2^{n-1} \cdot (n-1)! = (2n-2)(2n-4) \cdots 4 \cdot 2.$$

Dobivamo

$$a_n = \frac{(2n-1)!}{n! \cdot (n-1)!} = \binom{2n-1}{n}$$

pa je tvrdnja dokazana jer su binomni koeficijenti prirodni brojevi.

10 bodova

4. S  $M(a, b)$  označavamo najveću zajedničku mjeru brojeva  $a$  i  $b$ .

a) Neka je  $d = M(b, c)$  i  $b = db_0$ ,  $c = dc_0$ . Pritom je  $M(b_0, c_0) = 1$ .

Dana jednakost postaje

$$c_0(adc_0 + 1)^2 = d(5c_0 + 2b_0)(2c_0 + b_0).$$

Uočimo da je  $M(c_0, 2c_0 + b_0) = 1$ , jer su  $b_0$  i  $c_0$  relativno prosti, i  $M(c_0, 5c_0 + 2b_0) = M(c_0, 2b_0) = 1$ , jer je  $c_0$  (kao i  $c$ ) neparan broj. Stoga  $c_0 \mid d$ .

Nadalje je  $M(d, (adc_0 + 1)^2) = 1$ , odakle slijedi  $d \mid c_0$ .

Stoga mora biti  $c_0 = d$  pa je  $c = dc_0 = d^2$ , čime je tvrdnja dokazana.

10 bodova

b) Pretpostavimo da je  $c$  paran, tj.  $c = 2c_1$ .

Iz početne jednakosti dobivamo

$$c_1(2ac_1 + 1)^2 = (5c_1 + b)(4c_1 + b).$$

Stavimo  $d = M(b, c_1)$  i  $b = db_0$ ,  $c_1 = dc_0$ . Pritom je  $M(b_0, c_0) = 1$ .

Jednakost prelazi u

$$c_0(2adc_0 + 1)^2 = d(5c_0 + b_0)(4c_0 + b_0).$$

Kako je  $M(c_0, 5c_0 + b_0) = M(c_0, 4c_0 + b_0) = 1$  i  
 $M(d, (2adc_0 + 1)^2) = 1$ , mora biti  $d = c_0$  i

$$(2adc_0 + 1)^2 = (5c_0 + b_0)(4c_0 + b_0).$$

5 bodova

*Napomena.* Ukoliko učenik dođe do ovog rezultata, a nije riješio dio a), ovo se vrednuje s 10 bodova.

Zbog  $M(5c_0 + b_0, 4c_0 + b_0) = M(c_0, 4c_0 + b_0) = M(c_0, b_0) = 1$   
zaključujemo da mora biti  $5c_0 + b_0 = m^2$  i  $4c_0 + b_0 = n^2$ ,  
za neke  $m, n \in \mathbb{N}$ . 3 bodova

Pritom je  $m > n$  i  $m - n \geq 1$ . Vrijedi  $d = c_0 = m^2 - n^2$ ,  
te  $2ad^2 + 1 = 2adc_0 + 1 = mn$  pa imamo

$$\begin{aligned} mn &= 1 + 2ad^2 \\ &= 1 + 2a(m^2 - n^2)^2 = 1 + 2a(m - n)^2(m + n)^2 \\ &\geq 1 + 2a(m + n)^2 \\ &\geq 1 + 8amn \geq 1 + 8mn. \end{aligned}$$

No sada smo dobili kontradikciju  $mn \geq 1 + 8mn$ ,  
tj.  $7mn \leq -1$ . Dakle,  $c$  ne može biti paran. 7 bodova